



藥物成分

劑型

櫃號

Fluoxetine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-215

☞ 藥品商品名及含量

信樂膠囊 20 毫克/膠囊 (Sinzac)

克憂膠囊 20 毫克/膠囊 (Fluxen)

☞ 藥品作用

治療抑鬱症、暴食症及強迫症。

☞ 服用方式

1. 本藥依照症狀不同，通常每日服用 1~3 粒。可與食物併服或空腹服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良，有精神疾病、憂鬱症、癲癇、躁動症、心血管疾病、糖尿病病史者。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，特別是精神疾病用藥 pimozide、單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、lithium、tryptophan、抗凝血劑(包含 warfarin 及 NSAID 類藥物)、抗生素(包含 linezolid)等藥物。
3. 應嚴密觀測患者臨床病徵變化，若有惡化、自殺意念或不尋常的行為改變，請隨時與醫師聯絡。
4. 此藥物可能導致暈眩，在您未清楚藥物可能對您造成影響前不要開車或使用危險機械。
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的嗜睡作用。
6. 常見副作用為胃部不適、食慾不振、性慾降低、嗜睡、出汗增多、頭暈、過度勞累、口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

7. 如有下列任一症狀，請立刻就醫：抽筋、言語困難、紅疹、皮膚癢、心跳不正常、呼吸吞嚥困難、眼睛皮膚發黃。

8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

9. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。