



藥物成分	劑型	櫃號
Topiramate	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-780		

☞ 藥品商品名及含量

癲除膜衣錠 100 毫克/錠 (Topaless)

妥泰膜衣錠 100 毫克/錠 (Topamax F.C.)

妥泰分散型膠囊 25 毫克/膠囊 (Topamax sprinkle)

妥偏停持續性釋放膠囊 50 毫克/膠囊 (Trokendi XR)

☞ 藥品作用


本藥主要用為局部癲癇、預防偏頭痛及及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療。

☞ 服用方式

1. 癲癇相關治療：治療須從連續一週每晚給藥 25-50 mg 開始。隨後，每週（或每兩週）以 25- 100 mg/day 的速度增加劑量且分兩次服用。依病人的臨床效果來決定有效劑量。二歲以上兒童請依醫師給予劑量服用。
2. 偏頭痛：使用 topiramate 預防偏頭痛的建議劑量為 100 mg/day，分兩次使用。決定最適劑量須從連續一週，每晚給藥 25 mg 開始。隨後，每週以 25 mg/day 的速度增加劑量。如果病人無法忍受劑量決定期的給藥計畫，可延長劑量調整的間隔。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補服而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能不良，青光眼，或服用其他癲癇藥品者。
2. 如果有接受血液透析者，透析期間建議補服相當於每日劑量一半之補充劑量，補充劑量應於透析期間分次投予，若有疑慮請諮詢您的醫師/藥師。

- 
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服避孕藥、metformin、pioglitazone、glyburide 等。
 4. 服用該藥時應攝取充足水份，以降低腎結石發生之風險。
 5. 治療期間若有情緒異常及抑鬱狀況時，請告知醫師。
 6. 常見副作用為體重減輕、感覺異常、嗜睡、注意力不集中、疲倦、口水增加、暈眩、步履不穩、憂鬱等現象。
 7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥有被發現會分泌到母乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。