



藥物成分

劑型

櫃號

Celecoxib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-103

☞ 藥品商品名及含量

希樂葆膠囊 200 毫克/膠囊 (Celebrex capsule)

即克痛膠囊 200 毫克/膠囊 (Ecopain capsules)

☞ 藥品作用

為非類固醇類消炎止痛藥(NSAIDs)，用以緩解骨關節炎、類風濕性關節炎、急性疼痛、僵直性脊椎炎之症狀與徵兆及治療原發性經痛。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1~2 次，每次 1~2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病特別是服用 Aspirin 或其他非類固醇抗發炎藥物(NSAID)之後出現氣喘、蕁麻疹或其他過敏反應、磺醯胺類(sulfonamides)藥品過敏史、肝功能或腎功能不全、心臟疾病、腸胃道出血或潰瘍、水腫。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑、其他 NSAIDs 消炎止痛藥。
3. 如有要在兩週內進行冠狀動脈繞道手術，請事先告訴醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為頭痛、腹瀉、噁心，但一般都不嚴重若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀請立刻就醫：心肌梗塞、史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示有致畸胎的紀錄女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。