



藥物成分	劑型	櫃號
Beractant	吸入懸浮液	
版本：TPE202309／櫃號：2023-453		

☞ 藥品商品名及含量

守肺佳氣管吸入懸浮液 200 毫克/8 毫升 (Survanta Inh 200mg/8ml)

☞ 藥品作用

預防和治療早產兒之呼吸窘迫症。

☞ 使用方式


- Survanta 每一劑量為出生體重每公斤給予 100 毫克的磷脂質 (4 mL/kg)。
- 每個劑量分四次給，每 1/4 劑量都是在不同的姿勢時給予。順序如下：
 - (1)頭和身體稍為向下傾斜，頭轉向右側。
 - (2)頭和身體稍為向下傾斜，頭轉向左側。
 - (3)頭和身體稍為向上傾斜，頭轉向右側。
 - (4)頭和身體稍為向上傾斜，頭轉向左側。

☞ 不良反應

暫時性心跳緩慢、氧飽含量降低、氣管內插管迴流或阻塞、臉色蒼白、血管收縮、低血壓、高血壓、低或高二氧化碳血症。

☞ 注意事項

- Survanta 需冷藏貯存 (2-8°C)且避光。使用前，Survanta 應於室溫下回溫至少 20 分鐘或放在手中溫熱至少 8 分鐘。
- 未經開封使用的 Survanta 可在溫熱後 24 小時內放回冰箱，貯存供下次使用。Survanta 溫熱後再放回冰箱貯存的情形不應超過一次。每一單次使用的 Survanta 小瓶僅供一次使用，一旦開封，未用完的部份要丟棄。



3. 使用 Survanta 前應目測是否有變色。Survanta 的顏色為灰白色至淺棕色。貯存時若有沉澱發生，輕輕地以漩渦狀轉動小瓶（切勿振搖）至沉澱分散為止。切勿過濾或振搖 Survanta。在處理時表面可能會有些泡沫出現，此為產品原有的特性。

其他注意事項

1. 在投與 Survanta 前，醫師須判斷有無進行氣管內管抽痰以除去分泌物之必要。
2. 在投藥後會短暫的產生囉音和氣管分泌物增加的聲音。除非出現明顯的氣道阻塞的症狀，否則不需要進行氣管內抽痰處理或其他醫療行為。