



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Prochlorperazine</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-718		

## ☞ 藥品商品名及含量

洛嘔寧錠 5 毫克/錠 (Roumin)

諾安命錠 5 毫克/錠 (Novamin)

## ☞ 藥品作用

緩解噁心、嘔吐症狀，或改善與調整精神狀態。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 3-4 次，每次 1 粒(實際用法請遵照醫師指示)。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您(患者)或您的家人(患者)是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是老人家要注意是否有失智症，小孩則應注意是否曾被診斷有雷氏症候群。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是中樞神經抑制劑，且服用本藥後一小時內不可使用制酸劑、止瀉劑，以免影響藥物吸收。
3. 若本藥造成您腸胃不適，可與食物併服減緩腸胃不適情形。
4. 常見副作用為口乾、想睡或是便秘，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請盡速就醫：吞嚥困難、頭與臉部肌肉發生抽搐情形、舌頭不自主蠕動、手腳僵硬或是有不自主顫抖的狀況。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肌肉痙攣、發高燒、呼吸困難等症狀。
7. 懷孕等級 C，若孕婦服用此藥可能導致新生兒出現黃疸及

臺北市立



錐體外症候群，故女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，且本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。