



藥物成分	劑型	櫃號
Tiotropium	噴霧吸入劑	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-777		

☞ 藥品商品名及含量
 適喘樂舒沛噴吸入劑 2.5 微克/噴 (5 微克/劑量)
 (Spiriva Respimat)

外盒



外觀



☞ 藥品作用

用於慢性阻塞性肺疾(包括慢性支氣管炎及肺氣腫)之維持治療及降低惡化。

☞ 使用方式

通常每日 1 次，每次按 2 次噴藥。

第一次使用時，裝填藥罐：《拔、裝、壓、噴》

<p>安全扣</p>	<p>11. 拔： 拔蓋，按住安全扣並拔下透明底座。</p>		<p>2. 裝： 裝藥，將藥罐窄端開口對準吸入器。</p>
	<p>3. 壓： 將藥罐壓到底，推入吸入器。藥罐插入吸入器後便不可再取出。</p>		<p>4. 噴： 裝上透明底座後，勿再取下透明底座。第一次裝填好藥瓶時，請試噴三次。看到有霧狀的藥液再</p>

開始使用。

若藥物超過 7 天未使用，請先向地面噴一次；若超過 21 天未使用，請先重覆向地面噴三次後再正常使用。


每日使用的吸入方式：《轉、開、吸、蓋》



1. 轉：
每次轉動前，先蓋緊蓋子。每次使用時，以左手扶著吸入器，右手將透明底座依箭頭方向旋轉，直到聽到「卡嗒」聲。



2. 開：
將蓋子自側邊打開。



3. 吸：
吸藥前先吐氣（勿對著吸入器吐氣）。嘴巴含著吸入器（勿含住通氣孔），壓下灰色給藥按鈕，嘴巴慢慢地深吸氣。閉氣 5 秒鐘，再以鼻子慢慢吐氣。

4. 蓋：
完成一次劑量後，蓋回蓋子。休息半分鐘後，再吸第二次。

注意事項

1. 適喘樂為每日一次的維持性支氣管擴張劑，不可用於急性支氣管痙攣的最初治療，亦即不可用於急救治療。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是：狹角性青光眼、攝護腺肥大、或膀胱頸阻塞。


3. 使用適喘樂每日不可超過一次。
4. Spiriva 適喘樂藥罐(cartridge)只可以用 Respimat 舒沛噴吸入器來使用。
5. 目前孕婦或哺乳方面的資料十分有限，故除非醫師評估使用的益處大於風險才可使用。

☞ 清潔方式

1. 以濕布或濕紙巾清潔口含器及口含器內的金屬部份，每週至少擦拭一次。口含器如出現輕微褪色，不會影響吸入器的功能。
2. 必要時，可用濕布擦拭吸入器的外面。

☞ 如何觀測剩餘藥量

1. 本藥可提供 30 個劑量(60 噴)。劑量顯示計會顯示大約的剩餘藥量。當指針進入刻度上的紅色區域時，代表大約還剩 7 天 (14 噴)的藥量。此時您應請醫師開立新的處方，以取得新的適喘樂舒沛噴吸入劑。



2. 一旦劑量顯示計到達紅色區域刻度的頂端(亦即 30 個劑量已全部用完)，表示適喘樂舒沛噴吸入劑已空了並會自動鎖住，此時，透明底座將無法再被旋轉。
3. 適喘樂舒沛噴吸入劑從初次使用算起，最多只能用 3 個月，即使藥液尚未用完，也應該將適喘樂舒沛吸入劑丟棄，不可再使用。