



藥物成分	劑型	櫃號
Valproate	口服液	
版本：TPE202309／櫃號：2023-789		

☞ 藥品商品名及含量

帝拔癲口服液 200 毫克/毫升 (Depakine oral solution)

癲別液 200 毫克/毫升 (Sodium valproate oral solution)

☞ 藥品作用

可單獨或併用其它藥物來治療癲癇等相關症狀。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 請遵照處方使用，勿自行增加藥量、服藥次數或服藥日數。
2. 瓶蓋為保護兒童的設計，向下壓並旋轉即可打開瓶蓋。每次使用後須將瓶蓋鎖好。
3. 量筒標示為毫克數(mg)，使用時吸取藥袋上醫師開立的毫克數(mg)。
4. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補服而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟及血液相關疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 carbapenem 類抗生素、抗憂鬱劑(imipramine、SSRI)、抗精神病藥(phenothiazines 及 butyrophenones)、mefloquine、chloroquine、bupropion、tramadol、抗凝血劑(warfarin)、erythromycin、amitriptyline。
3. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 若病患(及其看護者)有任何自殺念頭及行為的徵兆，應立即尋求醫療方面的諮詢。

臺北市立

5. 常見副作用為嗜睡、胃不舒服、嘔吐、體重增加或減少、掉髮、震顫，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肝衰竭(可能症狀有黃疸、衰弱無力、厭食、有時伴隨有反覆性嘔吐和腹痛)、胰臟炎(可能出現急性腹痛或腸胃不適，如噁心、嘔吐或厭食)。
7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。