

藥物成分

劑型

櫃號

Pirfenidone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-350

☞ 藥品商品名及含量

比樂舒活錠 200 毫克/錠 (Pirespa Tablets)

☞ 藥品作用

治療特發性肺纖維化。

☞ 服用方式

1. 通常起始劑量為每日 3 次，飯後每次 1 粒，後續醫師逐步依據病情調整劑量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數；若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能異常。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 fluvoxamine、ciprofloxacin。
3. 請勿吸菸，吸菸會增強此類藥物肝臟代謝，進而降低藥品效用。
4. 服藥期間，請定期監控肝功能。
5. 可能會增加曬太陽產生的過敏(如:發疹、搔癢)，大多發生於起初六個月，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
6. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/步履不穩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有不良反應的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。