

藥物成分

劑型

櫃號

**Clopidogrel/
Acetylsalicylic acid**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-557

☞ 藥品商品名及含量

可保栓通膜衣錠 75 毫克/100 毫克/錠 (Coplavix F.C.)

☞ 藥品作用

可用來降低中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的病人再發生粥狀動脈硬化事件的機率(可以降低如：心肌梗塞、中風或其他因血管病變引起死亡的機率)。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是消化道潰瘍、顱內出血、血友病或肝腎方面病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是非類固醇類消炎止痛藥(NSAID)、抗凝血藥物。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 常見副作用為不明出血，若皮膚出現小面積紫斑/瘀血、眼睛充血或關節血腫、腸胃不適、輕微皮疹，請回診時特別告知醫師，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. **如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚紅疹、蕁麻疹、呼吸或吞嚥困難、解黑便、血尿等情況。**
6. 孕期間須謹慎使用，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。