



藥物成分	劑型	櫃號
Lidocaine、 Prilocaine	外用 藥膏	
版本：TPE202309／櫃號：2023-651		

☞ 藥品商品名及含量

利遞皮乳膏 5% 5g/支 (Lidiprine)

利皮乳膏 5% 5g/支 (Lipry)

☞ 藥品作用

皮膚表面止痛。

☞ 使用方式

1. 通常於外科處理時，供醫療人員操作。
2. 不可用於傷口上，黏膜上，並應避免敷在眼睛附近。有異位性皮膚炎患者應縮短敷用時間(15-30 分鐘)。
3. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加使用次數。若不慎忘記，請立即補用，但若已接近下一次使用時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對醃胺類局部麻醉劑過敏者、蠱豆症、癲癇、紫質症、高鐵血紅蛋白血症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 sulfasalazine、心律不整藥、癲癇藥、抑鬱藥、硝酸鹽類藥物、抗過敏藥、麻醉止痛藥等。
3. 不建議使用於早產兒(妊娠週數不滿 37 週)。
4. 常見副作用為皮膚局部反應，如：皮膚蒼白、發紅、溫度變化敏感，水腫，發癢、皮疹現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：蕁麻疹、胸悶、呼吸困難、視力模糊、心跳異常、癲癇等。
6. 目前對孕婦的安全性不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先

臺北市立聯合醫院
諮詢醫師/藥師。

