



## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

Dicloxacillin

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-153

## ☞ 藥品商品名及含量

奇福 R 黴素 250mg/膠囊 (Ziefmycin)

## ☞ 藥品作用

Dicloxacillin 屬於盤尼西林類抗生素，使用在葡萄球菌、 $\beta$ -溶血性鏈球菌和肺炎雙球菌等細菌所引起的感染症。

## ☞ 服用方式

1. 每 6 小時服用 1 次。請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
2. 若無特別指示，最好於空腹時服用，飯前 1 小時或飯後 2 小時服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 若您曾經對盤尼西林類藥物過敏或曾有藥物過敏的病史，請告訴醫師。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他種類的抗生素、抗凝血劑如 warfarin。
3. 請依照醫師處方之劑量和用法使用，並且完成整個療程，以減少細菌抗藥性的發生。
4. 長期使用本藥可能導致非敏感性菌過度增殖，故有重複感染時應停用本藥，並採取適宜的措施。
5. 常見副作用為：腹瀉、噁心、嘔吐、胃腸不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 若有發生搔癢、蕁麻疹、皮膚疹等過敏反應，請立即通知醫師/藥師。
7. 本藥可穿過胎盤，對孕婦之安全性尚未確立，女性計畫懷

臺北市立

聯合醫院

孕或已懷孕請告知您的醫師。

8. 本藥會分泌到乳汁中，但對胎兒的風險很小，有需要哺乳  
請事先諮詢醫師/藥師。