

藥物成分

劑型

櫃號

Pyridoxine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-721

## ☞ 藥品商品名及含量

維六素錠 50 毫克/錠 (Beesix)

醫維 B6 錠 50 毫克/錠 (Weta B6)

## ☞ 藥品作用

改善妊娠引起之噁心、嘔吐、皮膚炎或維他命 B6 缺乏症。

## ☞ 服用方式

1. 成人 Pyridoxine 依賴症：初劑量每日 30 至 600mg；維持劑量每日 50mg。膳食補充：每日 10 至 20mg，為時 3 週，繼之每日 2 至 5mg，為時數週。
2. 其他適應症如藥物誘生性 Pyridoxine 缺乏症、貧血、酒精中毒、先天性代謝機能障礙、兒童 Pyridoxine 依賴症等之用法請向醫師諮詢。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能不良或透析病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗結核病藥物或 levodopa。
3. 可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、嗜睡，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 雖然目前證據表明，本藥用於孕婦時的風險較小，但使用仍需審慎評估，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡(安全性尚未建立)，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。