



藥物成分

劑型

櫃號

Progesterone

陰道凝膠

版本：TPE202309 / 檔號：2023-361

☞ 藥品商品名及含量

快孕隆陰道凝膠 8% 90 毫克/條 (Crinone Vaginal Gel)

☞ 藥品作用

不孕症治療。

☞ 使用方式

1. 限陰道使用。

(1) 在確定排卵或月經週期第 18-21 天後，每日投與一劑。

(2) 若經證實已懷孕，連續三十天每日投與一劑。

2. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。

3. 使用方式：

(1) 將給藥器由密封包裝袋中取出，但此時先不要打開扭轉環。

(2) 緊握住給藥器的厚端，並像甩溫度計一樣用力甩幾次，確認將管中的藥品滑到細端底部。

(3) 將扭轉環扭開並丟棄。

(4) 以坐姿或躺臥並將膝蓋曲起，輕輕地將給藥器的細端插入陰道中。


(5) 用力將給藥器的厚端空氣囊擠扁，讓藥品進入陰道中，藥品會附著於陰道黏膜上，持續釋出黃體激素。

(6) 完成後將給藥器取出丟棄。



☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是血栓疾病、中風、心肝腎臟疾病、糖尿病、乳房或生殖器官腫瘤、憂鬱症等。

- 
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是巴比妥鹽類、抗癲癇藥 phenytoin、特定抗生素 ampicillin、tetracyclines、rifampicin 或利尿劑 spironolactone 等。
 3. 黃體素可能造成水腫，有癲癇、偏頭痛、氣喘、心臟以及腎臟疾病者，請小心監測。
 4. 常見副作用為局部刺激反應，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。如果發生子宮流血，病人應檢查子宮內膜，先確定清楚原因後才能使用本藥。
 5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：出現過敏反應(如紅疹、臉部腫脹、呼吸困難、黏膜破或疼痛)、皮膚或眼睛變黃或血栓或中風相關症狀(如嚴重頭痛、單側肢體無力、說話不清楚、平衡改變、臉部單側下垂、視力模糊或視力急遽變化、手腳異常腫脹)。
 6. 在懷孕早期本藥可作為輔助生殖治療，在懷孕期間不建議使用本藥。
 7. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。