



藥物成分

劑型

櫃號

Ezetimibe

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-590

☞ 藥品商品名及含量

怡妥錠 10 公絲/錠 (EZETROL TABLETS)

易吉妥錠 10 毫克/錠 (EZZICAD TABLETS)

☞ 藥品作用

高膽固醇血症、同型接合子性麥硬脂醇血症(植物脂醇血症)。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。可以在一天中的任何時候服用，隨餐或空腹均可。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中、重度肝功能異常者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特降膽酸藥物(Cholestyramine)及其他降血脂藥物。
3. 合併使用降膽酸藥物(Cholestyramine)時，在服用 Ezetimibe 後，必須間隔兩小時以上才能服用降膽酸藥物，或服用降膽酸藥物之後，必須間隔四小時以上才能服用 Ezetimibe。
4. 常見副作用為頭痛、腸胃道不適(腹痛、腹瀉、脹氣)、肌肉疼痛、肝指數升高，但一般都不嚴重，若症狀嚴重且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：
 - (1) 發生任何不預期的肌肉疼痛、觸痛、虛弱無力。
 - (2) 如果出現肌肉疼痛合併尿液變深或糞便顏色變白。

(3) 關節疼痛和極度疲倦等現象。

(4) 過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)。

6. 懷孕等級：C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。