

**藥物成分****劑型****檔號****Edoxaban****口服藥**

版本：TPE202309／檔號：2023-179

☞ 藥品商品名及含量

里先安膜衣錠 60 毫克/錠 (Lixiana)

里先安膜衣錠 30 毫克/錠 (Lixiana)

☞ 藥品作用

為一種凝血因子抑制劑，可減少凝血酶的生成而達到降低血栓形成的風險。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟、肝臟疾病、出血症狀。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是阿斯匹林、消炎止痛藥、抗心律不整藥物、抗生素、其他抗凝血劑、或抗憂鬱等精神用藥。
3. 請告訴醫師或牙醫師您有在服用此藥。
4. 常見副作用為貧血、頭暈、頭痛、腹痛、噁心、皮疹、搔癢、肝功能檢驗值異常、出血，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：
 - (1) 牙齦或鼻子出血，生理期出血不止。
 - (2) 咳血、吐血或吐咖啡狀嘔吐物。
 - (3) 粉紅或紅色尿液、糞便。
 - (4) 過敏反應如臉手腫脹、牙齦口腔腫脹等。
6. 目前對胎兒的風險不明，此藥可通過胎盤，且動物實驗顯

臺北市立

聯合醫院

示具有生殖毒性及出血風險，禁止用於懷孕婦女，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥會分泌到母乳裡，禁止於哺乳期間使用，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。