



| 藥物成分                       | 劑型         | 櫃號 |
|----------------------------|------------|----|
| <b>Tranexamic Acid</b>     | <b>口服藥</b> |    |
| 版本：TPE202309 / 檔號：2023-432 |            |    |

## ☞ 藥品商品名及含量

血迅膠囊 250 毫克/膠囊 (Trand)

斷血炎膠囊 250 毫克/膠囊 (Transamin)

## ☞ 藥品作用

全身及局部出血或出血性疾病。

## ☞ 服用方式

1. 成人 1 日 3~8 粒，分 3~4 次給與，依照年齡、症狀之輕重適當增減用量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或其他疾病，特別是血栓患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是不可使用於正接受凝血酶(Thrombin)給藥的患者。
3. 手術後臥床狀態下的患者及接受壓迫止血措施的患者，須謹慎給藥。
4. 常見副作用為便秘、噁心、食慾變差，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診；若發生發現異常時(如痙攣)應視情況停止給藥並立即就醫。
5. 懷孕等級 B，目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應/臨床資料不足/有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。