



藥物成分

劑型

櫃號

Vortioxetine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-796

☞ 藥品商品名及含量

敏特思膜衣錠 10 毫克/錠 (Brintellix Film-Coated Tablets)

☞ 藥品作用

改善情緒，用於治療成人憂鬱症。

☞ 服用方式

1. 通常為每日一次，每次 1 粒(實際用法請遵照醫師指示)
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑(MAOIs) 或 moclobemide、linezolid、selegiline、rasagiline 等藥物。
3. 通常需連續服用本藥四週尚能改善情緒問題，故治療期間請勿擅自停藥，以免影響治療成效。
4. 常見副作用為噁心，但一般都不嚴重且短暫，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請盡速就醫：不正常出血、紅疹或有自殺念頭等。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，且本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。