



藥物成分	劑型	櫃號
Theophylline anhydrous Theophylline S.R.M.	口服藥	
版本：TPE202309／流水號：2023-420		

☞ 藥品商品名及含量

善寧持續性藥效膠囊 200 公克/膠囊 (Xanthium)

喘克緩釋微粒膠囊 125 公克/膠囊 (Thoin SR.)

☞ 藥品作用

氣喘及支氣管痙攣。

☞ 服用方式

1. 建議劑量為每日 1~2 次，此藥可空腹(至少飯前一小時或飯後二小時)或飯後服用。
2. 長效膠囊可整粒吞服或打開讓顆粒與流質混合吞服(不可咀嚼)；以鼻胃管餵食的病人，可打開膠囊餵食，但切勿膠囊內微膠粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Theophylline 或其他藥物過敏。
2. Theophylline 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法忍受，請盡快告知您的醫師：胃不舒服、胃痛、腹瀉、頭痛、坐立不安、失眠、易怒。
3. Theophylline 與許多藥品會產生交互作用，包含非處方藥品、感冒藥、維他命等，請務必告知醫師所有您正在服用

的藥品，在未與醫師討論前請勿任意服用其他藥物。

4. 茶、咖啡、可樂及抽菸可能影響藥品的作用；若您平日有喝茶或咖啡的習慣，請告知您的醫師，因為可能需要調整劑量。
5. 若您有抽菸的習慣，請務必告知醫師，因為抽煙可能會降低 Theophylline 的效用。
6. 若您有心、肺、肝、腎、甲狀腺機能亢進、消化性潰瘍或癲癇等方面的疾病，請先告知您的醫師。
7. 孕婦用藥等級：C。若您已懷孕，就診時請務必告知醫師並告知週數。若您計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。
8. 若您給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。