

藥物成分

劑型

櫃號

Piracetam

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-348

## ☞ 藥品商品名及含量

**第一項商品未決標**

**舊商品：(暫)800 毫克/顆**

## ☞ 藥品作用

腦血管障礙及老化所引起的智力障礙、皮質性陣發性抽搐。

## ☞ 服用方式

1. 一般起始劑量為每日 1 次，每次 1.5-9 粒。醫師會依病情調升維持劑量，並依劑量調整每日分二至三次服用。
2. 開始以本藥治療後，必須持續服用直到症狀解除。當療程結束時，為避免突然復發，請依醫師指示逐漸調降劑量。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺相關疾病、腦內出血病史、腎臟疾病、苯酮尿症及對 pyrrolidone 衍生物有過敏的病史。
2. 因本藥會影響血小板凝集功能，如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是甲狀腺素。
4. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 服藥期間請定期監控腎功能。
6. 常見副作用為體重增加、眩暈、噁心嘔吐、腹痛腹瀉、

頭痛、嗜睡、焦慮，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 如果有下列症狀 請立刻就醫：運動機能亢進、血管神經性水腫、過敏反應（皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛）。
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。