



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Etofenamate</b>	<b>外用藥膏</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-588		

## ☞ 藥品商品名及含量

**痛寧酸痛凝膠 100 毫克/公克 (Tonin)**

**思舒酸痛凝膠 100 毫克/公克 (Teiria)**

## ☞ 藥品作用

緩解發炎反應引起的症狀，具消炎、鎮痛作用。

## ☞ 使用方式

1. 通常每日 2~3 次，適量塗抹於患部，請遵循醫師指示服用，切勿超過建議使用量或使用次數。
2. 局部外用，適量塗抹於疼痛處。可先熱敷患部再擦藥按摩效果更佳。
3. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
4. 本藥限外用，不可內服，亦不可用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部)，也不可塗抹於割傷處、擦傷處、濕疹或受損的皮膚的皮膚上。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 aspirin 或非類固醇消炎藥過敏者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服止痛藥。
3. 使用前、後請清洗雙手。
4. 本品請保存於 30°C 以下。
5. 常見副作用為皮膚起疹、搔癢、紅腫，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師；本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。