



藥物成分	劑型	櫃號
Exemestane	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-203		

☞ 藥品商品名及含量

諾曼癌素糖衣錠 25 毫克 (Aromasin S.C.)

☞ 藥品作用

用於停經婦女患有早期侵犯性乳癌之輔助治療，也可用於接受抗雌激素無效之晚期乳癌。

☞ 服用方式

1. 本藥通常每日服用 1 次，每次 1 粒。建議**飯後服用**。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若接近下次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝、腎功能不良、果糖耐受性不良、骨質疏鬆**。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，特別是會誘導本藥代謝之藥物，如 **rifampin、carbamazepine、phenytoin** 等，或含有雌激素之藥物。
3. 此藥物可能導致暈眩，在您未清楚藥物可能對您造成影響前不要開車或使用危險機械。
4. 有骨質疏鬆或骨質疏鬆高危險族群婦女，建議治療前先進行骨質密度健康評估。
5. 常見副作用為熱潮紅、關節疼痛、疲倦、頭痛、失眠、排汗增加、噁心嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立即就醫：**心臟不適、心肌梗塞、骨質疏鬆性骨折、胃潰瘍、肝炎**。
7. 懷孕等級 D，本藥不適用於停經前婦女，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。