



藥物成分

劑型

櫃號

Lamotrigine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-643

☞ 藥品商品名及含量

樂命達錠 50 毫克、100 毫克(Lamictal) ,

樂平癲錠 50 毫克(Latrigine)

癲癩樂美錠 100 毫克(Lamogin)

☞ 藥品作用

癲癩、鬱期雙極性情感症狀、預防鬱躁期循環的雙極性情感症狀。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癩、肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癩藥、抗肺結核藥 rifampin、抗病毒藥 lopinavir、減肥藥 orlistat、口服避孕藥或其他荷爾蒙替代療法。
3. 本藥可能會讓人暈眩、嗜睡，在還沒確定對你有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 開始服藥須約 4 週後才會開始發揮藥效，請耐心維持醫囑。
5. 常見副作用為皮疹、頭昏眼花、頭痛、視力模糊、噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦、關節痛、疼痛、背部疼痛、侵略行為、易怒，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹)

或口腔破皮脹痛)、史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。

7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。