



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Brinzolamide/ Timolol</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309／櫃號：2023-067		

## ☞ 藥品商品名及含量

複方愛舒壓懸浮液 5 毫升/瓶 (Azarga)

## ☞ 藥品作用

用於治療曾使用單方療法效果不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓成人患者，以降低其眼內壓。

## ☞ 使用方式

1. 通常建議每日使用 2 次，一次使用 1 滴。(實際用法用量請遵照醫師指示)。
2. 使用前須充分振搖，讓藥水均勻混合。
3. 使用兩種以上的眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘再使用下一種眼藥水。
4. 使用兩種眼用藥品時，請先使用藥水再使用藥膏，並間隔 10 分鐘以上再用藥膏。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是支氣管氣喘病史或慢性阻塞性肺病、重度腎功能不全者、嚴重心臟疾病病史的患者應謹慎使用。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有對藥物過敏或是在服用其他藥物，特別是曾對磺胺類藥物有過敏紀錄者，若發生嚴重反應請立即連絡您的醫師。
3. 本藥若與口服β阻斷劑併用可能會增強全身性β阻斷的作用，不建議同時一起使用。
4. 治療期間最好暫時勿配戴隱形眼鏡，若一定需要戴隱形眼鏡，請於點用本藥品後至少 15 分鐘再行配戴。
5. 常見副作用為口中味覺異常、苦味、眼睛充血、視覺模糊，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中觀察到

brinzolamide 的不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

7. Brinzolamide 分泌到母乳的量不明；Timolol maleate 則會分泌到乳汁中，使用藥物期間不建議哺乳。

### ∞ 其他注意事項

1. 為了保持藥物在無菌狀態，請勿碰到藥瓶的尖端。
2. 本藥可能會引起暈眩、疲倦或嗜睡症，可能使需要精神警覺性或身體協調性的工作的能力受損。