



藥物成分

劑型

櫃號

Lenalidomide

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-267

☞ 藥品商品名及含量

瑞復美膠囊 25 毫克/膠囊 (Revlimid Capsules)

瑞復美膠囊 15 毫克/膠囊 (Revlimid Capsules)

瑞伏駭膠囊 15 毫克/膠囊 (Leavdo Capsules)

☞ 藥品作用

多發性骨髓瘤治療

☞ 服用方式

1. 一般用法為每日一次，連續服用 3 週後，停藥 1 週。
2. 可單獨服用或與食物併服。本藥請整顆吞服，不可打破、嚼碎或打開膠囊。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為腹瀉、支氣管炎，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 服藥期間，請定期監控全血球數量。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血栓形成(腿部腫脹、壓痛、疼痛和發紅、呼吸急促、胸痛)、皮膚反應(出疹、皮膚或嘴唇黏膜、眼睛、口部出現水泡或腫脹)、異常的衰弱和疲倦、大量瘀傷、感染一直好不了、異常出血、發燒。
6. 在使用本藥治療期間以及停止使用本藥後 4 週內，不得捐贈血液或精液。
7. 可能懷孕的女性，需於開始接受用藥治療的 4 週前、用藥期間、用藥暫停期間、徹底停藥後 4 星期內，採取有效的

避孕措施。

8. 男性病人即使接受輸精管結紮，與可能懷孕的女性進行性接觸時，仍應採取有效的避孕措施。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。