

藥物成分

劑型

櫃號

Sunitinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-759

☞ 藥品商品名及含量

艾舒尼膠囊 12.5 毫克/膠囊 (Alsuni Capsules)

紓癌特膠囊 12.5 毫克/膠囊 (Sutent Capsules)

☞ 藥品作用

是一種抗腫瘤標靶藥，可抑制腫瘤細胞增生和血管生成，使腫瘤萎縮或延緩轉移的進展。用於治療腸胃道間質腫瘤、晚期腎細胞癌、胰臟神經內分泌腫瘤、腎細胞癌輔助治療。

☞ 服用方式

1. 通常每日1次，每次3~4粒，依照疾病差異會有不同的療程。服用時請整粒隨餐或空腹吞服，勿打開或嚼碎膠囊。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有肝功能異常、心臟疾病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能異常、近期預計進行手術或傷口癒合不佳。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是肺結核藥物、抗黴菌藥物、抗癲癇藥物、心律不整藥物、抗凝血藥物、抗人類免疫缺乏病毒藥物、骨質疏鬆藥物及聖約翰草等。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。本藥可能增加顎骨壞死風險，請定期進行牙科檢查並維持口腔健康。
4. 常見副作用為疲勞、無力、腹瀉，口腔黏膜破損、噁心、食慾減低、嘔吐、腹痛、手足症、高血壓、出血、

味覺失調、消化不良和血小板減少症、皮膚變色，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心臟功能異常(胸悶、胸痛、心跳異常、持續且無法控制的高血壓)、極罕見的嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)、肝炎(嘔吐、食慾減少、黃疸等)、出血症狀(黑便、暗褐色尿液、咳血、嚴重腹痛、出血不止或瘀青)、腎炎(尿量減少、蛋白尿等)。
6. 懷孕：目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
哺乳：本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。