

藥物成分

劑型

櫃號

Cyclobenzaprine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-135

## ☞ 藥品商品名及含量

服樂適持續性釋放膜衣錠 15 毫克/錠  
(Flexer Extended-Release F. C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

緩解急性骨骼肌肌肉之痙攣。

## ☞ 服用方式

1. 本藥須由醫師處方使用。
2. 對大部份的病患而言，成人建議劑量為每天服用一次，一次 15mg(一錠)。
3. 某些病患可能須要一天 30 mg(一次服兩錠)。
4. 建議每日於相同時間服用。
5. 本品不建議服用超過 2 週。

## ☞ 注意事項

1. 若您曾對本藥過敏，請務必先告知您的醫師或藥師。
2. 請先告知醫師或藥師您正在服用的藥物，如：維他命，營養補充品，中草藥類產品，特別是下列藥物：Guanethidine、Tramadol、鎮定安眠藥、感冒藥、抗過敏藥、麻醉性止痛劑或在過去 14 天中曾經使用 MAOI 類藥物(單胺氧化酵素抑制劑)。
3. 若您有下列病史，請先告知醫師：甲狀腺機能亢進、心律不整、心衰竭、肝功能不佳、青光眼、排尿障礙。
4. 若您已懷孕、計畫懷孕、計劃或正在哺乳，請先告知醫師。
5. 服用本藥可能會使您頭昏、想睡覺，服藥期間請避免駕駛或操作危險性機械。
6. 此藥物可能導致口乾舌燥，您可利用無糖的糖果、口香糖或冰塊減少口乾不適。若口乾的情形持續超過兩週或變嚴重，請和醫師連絡。
7. 可能的副作用：副作用不一定發生，提醒您：

臺北市立



- (1) 若您發生下列少見但較嚴重副作用，請立即就醫：皮疹，蕁麻疹，臉部和眼睛腫脹，臉部、喉嚨、嘴唇腫脹或發麻，心律不整，心跳加快，無法排尿超過六小時，癲癇，震顫，嚴重疲倦、嗜睡，精神混亂。
- (2) 若您發生下列副作用，請於下次回診時告知醫師，若症狀嚴重或不會自行消失，請提前回診告知您的醫師：痤瘡，視覺模糊，腹瀉，便秘，口乾，頭痛，疲倦。

## ∞ 藥品儲存

儲存於 25°C 以下、乾燥、避光及兒童伸手不及之處。