



藥物成分

Ofloxacin

劑型

耳滴劑

櫃號

版本：TPE202309 / 檔號：2023-688

☞ 藥品商品名及含量

耳復欣點耳液 3 毫克/毫升 5 毫升/瓶 (Earflo Otic)

耳普欣點耳液 3 毫克/毫升 5 毫升/瓶 (Ofloxin Otic)

☞ 藥品作用

本品為外用滴耳藥水，具抗菌之作用，用於治療成人及小兒外耳炎，成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管之小兒急性中耳炎。

☞ 使用方式

耳滴劑使用說明：

1. 用肥皂及清水清洗雙手。
2. 用濕的面巾清潔耳朵，再將耳朵擦乾。
3. 將藥劑輕輕滾動或輕握數秒，使藥液溫度接近體溫，減少對耳朵的刺激。
4. 耳滴劑使用前須充分振搖。



5. 側躺或頭傾斜使受感染耳側朝上。
6. **成人可將耳葉拉向後上方，小孩則拉向後下方**，使耳道變直。
7. 滴入適量藥劑，保持耳部朝上使藥液流入。



8. 藥劑滴入後，輕拉耳朵或輕壓耳珠，使氣泡跑出。
9. 保持耳部朝上，讓藥劑停留約 10 分鐘後，再讓它自然流出，以紙巾擦拭留出藥液。
10. 用肥皂及清水清潔雙手。



 注意事項

1. **本藥品為耳用滴劑，僅供耳部外用，不得滴眼或內服。**
2. 通常每日使用 2 次，每次 6~10 滴。劑量依疾病嚴重度及個別反應不同，兒童的使用劑量可能較低，**必須遵照醫師指示常規用藥，不可自行更改劑量或自行停藥。**
3. 使用時應避免接觸到滴管頭而造成污染，以保持藥液清潔。
4. 請依照醫師指示使用，若不慎忘記使用，請立即補滴，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補滴而使用雙倍劑量。
5. 儲存方法：**室溫 25°C 以下保存，並不建議置於冰箱內冷藏，避免給藥後造成暈眩不適**；開瓶後，保存期限為六個月，若藥液出現異常變化請勿使用。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
7. 常見副作用為耳朵疼痛或搔癢、頭痛、暈眩、味覺異常、耳鳴、紅疹，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. **如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚發疹、過敏反應、聽力異常等。**