



藥物成分	劑型	櫃號
Darunavir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-138		

☞ 藥品商品名及含量

信澤力膜衣錠 800 毫克/150 毫克/200 毫克/ 10 毫克
(Symtuza Film-Coated Tablets)

☞ 藥品作用

SYMTUZA® 為一個完整治療配方，適用於治療下列感染人類免疫不全病毒第1型(HIV-1)的成人病人以及體重至少40公斤的兒童病人。

☞ 服用方式

本藥須由醫師處方使用。建議劑量為每日一次隨餐服用一錠。對無法吞嚥整顆錠劑的病人，可使用切藥器切成兩半，切開後應立即服用完整的劑量

☞ 注意事項

1. 不建議用於重度腎功能不全、重度肝功能不全的病人。
2. 對懷孕的病人，不可開始使用 Symtuza。對在使用 Symtuza 治療期間懷孕的病人，建議改用其他替代療法治療。
3. 若發生下列副作用，請於下次回診時告知醫師：腹瀉、皮疹、噁心、疲倦、頭痛及腹部不適。若症狀嚴重或不會自行消失，請提前回診告知您的醫師。
4. Symtuza 之個別成分與其他多種藥物間會有交互作用。就診時，請務必先告知醫師，您正在服用的所有藥物。
5. 可能引起的嚴重不良反應如下：B 型肝炎嚴重急性惡化、肝毒性、嚴重皮膚反應、免疫重建症候群、新發生或惡化的腎功能不全、乳酸中毒/嚴重肝腫大合併脂肪變性。如有發生，請立即停止使用，洽詢醫師診治。



藥品儲存

請存放於 30°C 以下。置於遠離兒童視線與兒童不及之處，保持容器密封並將乾燥劑留在瓶內，以避免濕氣。在原始容器之外最多可以存放 7 天。