



藥物成分

劑型

編號

Methimazole

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-666

☞ 藥品商品名及含量

甲硫嗎唑錠 5 毫克/錠 (Methimazole)

利甲錠 5 毫克/錠 (Lica)

☞ 藥品作用

抑制甲狀腺激素的合成，用於治療甲狀腺功能過高症及作為甲狀腺切除前預先治療。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是血液方面的疾病，如：白血球減少(leukopenia)，血小板減少(thrombocytopenia)，再生不良性貧血或是肝臟疾病(肝炎，黃疸)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是碘及碘化物、抗凝血劑(如 warfarin)。
3. 如果有要開刀或拔牙，請告訴其他科別的醫師或牙醫師您正在服用此藥。
4. 常見副作用為皮膚發疹、蕁麻疹、噁心，嘔吐等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發燒，寒顫，頭痛，眼睛或皮膚變黃，聲音嘶啞，口內炎，喉嚨發炎或疼痛，右側腹痛且食慾不振，皮膚出疹，身體不適，關節紅腫痛，異常出血或瘀青。
6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥

臺北市立

可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥

師。

TAIPEI CITY

TUNG CITY HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL