



藥物成分

劑型

櫃號

Ethambutol

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-199

## ☞ 藥品商品名及含量

易復癆錠 400mg/錠 (Eambutol)

醫肺必妥膜衣錠 400mg/錠 (E-butol)

## ☞ 藥品作用

治療結核病

## ☞ 服用方式

1. 每日服用一次，通常會併用其他的抗結核桿菌藥一起使用。
2. 此藥可能會造成胃腸道不舒服，可隨餐服用減少不適症狀。
3. 未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 ethambutol 或其他藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟疾病、痛風或眼睛方面的問題，例如白內障、視神經炎、糖尿病性視網膜病變、眼部炎症。
2. 糖尿病、酒精中毒及視神經炎的患者，不宜使用本劑。
3. 如需使用含鋁的制酸劑，服藥時間請間隔至少 4 小時。
4. 請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
5. 服藥期間請定期回診配合追蹤肝功能、腎功能、血液學及視力檢查。
6. 可能會有食慾不振、嘔吐、胃部不適、頭痛、頭暈的副作用，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：視覺模糊、無法辨識紅色與綠色、視力突然改變、手足麻痺感、皮膚紅疹、發癢。

臺北市立

8. 本藥目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師。
9. 本藥可能會分泌到母乳裡，若您正在哺乳，就診時請務必告知醫師。