

藥物成分

劑型

櫃號

Atropine

眼用藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-040

## ☞ 藥品商品名及含量

安妥眼藥水 1% (Antol Eye Drops 1%)

亞妥明眼藥水 0.01% (Atropine Eye Drops 0.01%)

雅托平眼藥水 0.3% (Tropine Eye Drops 0.3%)

阿托品眼藥水 0.3% (Atropine Eye Drops 0.3%)

## ☞ 藥品作用

散瞳、睫狀肌麻痺。

## ☞ 使用方式

1. 眼用滴劑，請遵照醫師指示使用，通常一天 1-2 次，每次 1 滴。勿自行改變劑量、用法或自行停藥。使用上有任何疑問應請教醫師或藥師。
2. 使用眼藥前都請先用肥皂洗淨雙手並摘除隱形眼鏡，過程中請注意眼睛或其它東西不可接觸到滴管頭或瓶口，避免汙染眼藥。

### 眼藥水/眼用凝膠使用步驟



## ☞ 注意事項

1. 已知對本藥之任何成份過敏者須告知醫師。
2. 對有青光眼或有導致狹角性青光眼傾向之患者禁止使用本品。
3. 若有光敏感(畏光)現象，可戴太陽眼鏡改善。

4. 瓶裝眼藥水開瓶後最多只能存放一個月，逾時請丟棄。單支包裝眼藥水為可回蓋式包裝，不含防腐劑，開封後 24 小時未使用完，請丟棄。
5. 若需要使用多種眼藥水，兩種藥水使用間隔至少為 5 分鐘。同時使用澄清眼藥水與懸浮液時，先點澄清眼藥水，再點懸浮液；若眼藥水併用眼藥膏，先點眼藥水再點眼藥膏，使用間隔至少為 10 分鐘。
6. 使用後會產生視力模糊，應避免駕駛汽機車及操作危險性機械。
7. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。