



藥物成分	劑型	櫃號
Latanoprost	眼用藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-644		

## ☞ 藥品商品名及含量

舒而坦眼藥水 0.005% 50 微克/毫升 2.5 毫升/瓶 (Xalatan)  
 博士倫博舒坦眼用液劑 0.005% 50 微克/毫升 2.5 毫升/瓶  
 (Latanoprost)

## ☞ 藥品作用

青光眼及降低眼壓過高患者之眼內壓。

## ☞ 使用方式

1. 每日 1 次，晚間每次 1 滴於病眼。
2. 佩戴軟式隱形眼鏡時請勿使用。點眼藥前應先將隱形眼鏡取出，在點藥後 15 分鐘才可重新配戴隱形眼鏡。
3. 使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘。先使用眼藥水再使用眼藥膏
4. 請依照醫師指示，不可自行調整劑量或增加投藥次數。每日的劑量不可以超過一滴。若忘記投與一次使用劑量時，下次仍應依正常劑量投藥。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 未開封藥品應置於攝氏 2~8°C 冰箱內(勿冷凍)，並避光保存。開封後可儲存於 25°C 之室溫。眼用藥品開封一個月，殘餘藥品應丟棄。
4. 常見副作用為眼睛刺激感、視力模糊、結膜充血、虹膜顏色變化等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果使用後產生眼睛劇痛、嚴重視力模糊或持續發紅、腫、熱、刺激感等情況，請立刻就醫。
6. 目前對胎兒風險不明，但資料顯示動物實驗中有胚胎毒性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。