



藥物成分

劑型

櫃號

Acyclovir

外用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-012

☞ 藥品商品名及含量

艾瑟樂康乳膏 50 毫克/克 5 克/條 (Axcel Acyclovir Cream)

艾剋樂芙乳膏 50 毫克/克 5 克/條 (Aclovir Cream)

☞ 藥品作用

用於治療單純疱疹性角膜炎

☞ 使用方式

1. 通常每天 5 次，約隔 4 小時塗抹一次。
2. 使用前要先把患部皮膚清潔且弄乾，戴保護性手套以防感染擴散，小心地塗抹。取足量的藥膏將患部完全覆蓋，藥膏不可以碰到眼睛。
3. 開封 6 個月後，未用完之殘藥請丟棄。
4. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是免疫系統疾病、肝腎功能障礙、後天免疫缺乏症候群。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗病毒藥、免疫抑制劑。
3. 常見副作用為刺痛、發癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. **如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏現象(搔癢或蕁麻疹、臉部或四肢腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難)、排尿量或排尿頻率突然變少、皮膚或眼睛變黃。**
5. 當生殖器官出現疱疹病癥時，不可以從事性行為；即使感染者之生殖器官無症狀，也可能會傳播疱疹。

臺北市立

6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師。