



藥物成分

劑型

櫃號

Rizatriptan

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-381

## ☞ 藥品商品名及含量

羅莎疼錠 5 毫克/錠 (Rizatan)

## ☞ 藥品作用

有先兆或無先兆偏頭痛發作之急性緩解。

## ☞ 服用方式

1. 症狀發生時使用，一般起始劑量為 1-2 粒，2 劑間隔至少 2 小時，24 小時內不宜超過 6 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良、高血壓、糖尿病、高膽固醇症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗偏頭痛藥品、麥角生物鹼(ergotamine)、單胺氧化酵素抑制劑、抗憂鬱藥、propranolol。
3. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為胸痛、頭暈、嗜睡和無力感、疲倦、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、蕁麻疹或口腔破皮、脹痛、呼吸困難、視力喪失、身體一側麻木或無力、嚴重的胃痛、出血性腹瀉。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。