



藥物成分	劑型	櫃號
Amorolfine	外用液	
版本：TPE202309 / 流水號：2023-520		

☞ 藥品商品名及含量

雅舒安抗甲癬油劑 55.74 毫克/毫升 (Amocoat)

泰雅指抗甲癬油劑 55.74 毫克/毫升 (Taiya)

☞ 藥品作用

藉由影響黴菌細胞膜上固醇的生合成，改變細胞膜的構造，達到抑制黴菌及殺黴菌的作用，用以治療皮真菌、酵母菌及黴菌引起的甲癬。

☞ 使用方式

- 通常每星期 1 或 2 次局部使用，建議睡前使用。
- 治療期間視感染部位而定，治療期間約 6-12 個月(手指甲治療期間通常為 6 個月；腳指甲須 9-12 個月)。
- 油劑塗抹方式：
 - 治療前，先戴上手套將感染部位的指甲剪除或指甲面磨平，以酒精棉紙擦拭感染的趾(指)甲表面，小心慎勿銼到趾(指)甲周圍皮膚。
 - 使用給藥板(隨瓶附贈)將藥液均勻塗抹在受感染的指甲面，每星期 1 或 2 次，盡可能將藥液塗抹到指甲或皮膚下，以增強藥效。等待 3-5 分鐘，讓指甲油乾燥形成薄膜，對每片受感染的趾(指)甲患部再重複施藥一次。
 - 用後以酒精棉紙擦拭瓶頸以保乾淨，並立即關緊。
 - 每次施藥前先以酒精將膜洗除，再重複將受感染的指甲修剪磨平(注意事項同前)，然後用給藥板將藥液均勻塗抹在患部。
 - 重覆(1)到(5)步驟，直到趾(指)甲再生，患部痊癒為止，請勿間斷。

☞ 注意事項

- 治療前指甲的處理愈徹底治癒率愈高。

2. 用在感染趾(指)甲的銼刀禁忌用在健康趾(指)甲。
3. 治療期間應避免使用化妝品類的指甲油劑及人工指甲
4. 用藥後 8 個小時內請勿洗澡或淋浴。
5. 此藥瓶在使用後需立刻關緊以免油劑揮發乾掉。
6. 若工作或日常可能接觸到有機溶劑(稀釋液、酒精等)時，應穿戴防透手套 以保護趾(指)甲上本品油劑的完整。
7. 對使用本品趾(指)甲油劑呈現過敏反應之病患，不可再使用本趾(指)甲油劑。
8. 有極少數的病人在塗敷此油劑後，趾(指)甲偶爾會發生輕度、短暫灼熱感。
9. 尚無臨床證據顯示可用於兒童，因此不宜使用於兒童。
10. 使用本品趾(指)甲油劑之後，Amorolfine 於體內的含量極低，因此對於人類胎兒的危險應可忽略。但由於缺乏治療懷孕和哺乳母親之臨床經驗，因此本油劑仍應避免用於懷孕和哺乳期期間。
11. 避開熱源儲存，儲存溫度應低於 25°C，並置於兒童不能觸及之處。