



藥物成分

劑型

櫃號

Barium sulfate

口服液

版本：TPE202309 / 檔號：2023-047

☞ 藥品商品名及含量

鋇脫普-LV 99.5 克/100 克, 300 克/瓶 (Baritop LV powder for oral suspension)

☞ 藥品作用

為一種會附著於消化道黏膜上的顯影劑。配合空氣的導入和藉由黑與白的對比，能照出雙重對比影像。適用於食道、胃、十二指腸雙重顯像攝影。

☞ 服用方式

1. 於藥粉中加入水，製成 200~240% w/v 濃度懸濁液體。調製濃度請依照醫師指示添加需要之水量。上下用力搖晃 30 次以上，服用前靜置 10 分鐘以上。

濃度調製	全量	添加水量
約 200%	149 mL	82 mL
約 210%	142 mL	75 mL
約 220%	135 mL	68 mL
約 230%	130 mL	63 mL
約 240%	124 mL	57 mL

2. 成人標準口服用量取決於檢查部位。

食道：30~50 mL

胃、十二指腸：200~230 mL

3. 懸浮液需要空腹服用，服用時再輕輕的搖晃一下。

4. 為了檢查結果正確性，請於檢查前禁食和禁水 6 小時。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是消化道穿孔、胃腸道阻塞、發炎性腸道疾病、糖尿病、癌症、肺部相關疾病。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他處方和非處方藥物。

3. 請在服用藥物後的幾天補充足夠的水分。

4. 常見副作用為便秘、噁心嘔吐、腹瀉或腹痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列疑似嚴重過敏反應症狀，請立刻就醫：低血壓、支氣管痙攣、呼吸障礙、皮膚反應（包括皮疹、蕁麻疹和搔癢等）。

6. 目前對胎兒的風險不明。但由於服用此藥物時有 X 光照射關係，對懷孕婦女患者，限於診斷上的效益大於危險性時才使用。

7. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。