



藥物成分

劑型

櫃號

Buspirone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-544

☞ 藥品商品名及含量

怡必隆錠 5 毫克/錠 (Sepirone)

☞ 藥品作用

治療焦慮症或短期焦慮症狀。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~3 次，每次 1 粒，每日最高劑量勿超過 60 毫克。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇、肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(包含非處方藥)，特別是單胺氧化酵素抑制劑(MAO inhibitors)、鎮靜安眠劑、抗組織胺、肌肉鬆弛劑等。
3. 本藥可能會讓人暈眩、嗜睡，在還沒確定對你有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
5. 常見的副作用為頭暈、噁心、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 懷孕分級：B，若女性計畫懷孕請告知您的醫師；本藥分泌到母乳裡的量不明，有需要哺乳者請事先諮詢醫師/藥師。