



藥物成分

劑型

櫃號

Pilocarpine

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-342

## ☞ 藥品商品名及含量

舒樂津錠劑 5 毫克/錠 (Salagen Tablets)

液泌快膜衣錠 5 毫克/錠 (Salicret F.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療因頭頸癌使用放射治療及因自體免疫性乾燥症導致口乾症狀。

## ☞ 服用方式

1. 放射治療導致口乾症狀：起始劑量一般為每天 3 次，每次一粒，其後醫師依治療反應及忍受度做調整。
2. 自體免疫性乾燥症：一般為每天 4 次，每次一粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、心率不整、膽道疾病、腎結石、氣喘、慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺部疾病、眼部疾病(如發炎或青光眼)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是腎上腺素拮抗劑、副交感神經製劑、抗膽鹼製劑。
3. 本藥可能會造成視覺干擾，當夜晚開車或在光線不足下從事危險活動時應特別注意。
4. 服用本藥可能使流汗過多，嚴重會導致脫水，因此在炎熱天氣活動時須留意適時補充水分，以防止體液流失。
5. 常見副作用為出汗、胃腸不適、頭暈、頭痛、唾液過多、流淚、視力改變、咳嗽、疲倦、虛弱、低血壓、高血壓、心跳過快、心跳過慢，但一般都不嚴重，若症狀

惡化且無法忍受請回診。

6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。