



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Empagliflozin/ linagliptin</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-184		

## ☞ 藥品商品名及含量

**糖順平膜衣錠 25 毫克/5 毫克/錠 (Glyxambi)**

## ☞ 藥品作用

主要用於輔助治療經飲食及生活習慣調整後，仍無法達到血糖控制目標的第二型糖尿病(使用metformin合併linagliptin或empagliflozin未能達到適當血糖控制者或已在服用linagliptin及empagliflozin合併治療者)。

## ☞ 服用方式

1. 通常為一日 1 次，每次 1 粒，或依照醫師指示。可與食物一起服用，亦可空腹服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有腎臟疾病，包含透析病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑、糖尿病促敏劑、胰島素。
3. 常見副作用為泌尿道感染、上呼吸道感染、鼻咽炎、低血糖、低血壓、排尿增加，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 避免併服酒精性飲料。
5. 服藥時若發生低血糖症狀(心悸、冒冷汗、飢餓、頭暈等)，先食用含糖飲料或糖果，仍未見改善時應立即就醫。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：如果有下列症狀，請立刻就醫：胰臟炎、乳酸酸中毒、酮酸中毒(不明原因過度換

氣、肌肉痛、嗜睡、心跳緩慢、寒冷)；嚴重泌尿道感染(生殖器部位紅腫熱痛、發燒)；過敏反應(血管水腫、蕁麻疹)；急性腎臟損傷(急性疾病、嘔吐、嘔吐、過度熱暴露)。

7. 由於動物資料顯示有不良腎臟影響，因此不建議在懷孕第二孕期和第三孕期使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，可能對接受哺乳的嬰兒造成嚴重的不良反應，服藥期間不建議哺乳。