

藥物成分

劑型

櫃號

Pregabalin

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-716

☞ 藥品商品名及含量

利瑞卡膠囊 75 毫克/膠囊 (Lyrica)

萊瑞康膠囊 75 毫克/膠囊 (Lygaba)

☞ 藥品作用

緩解糖尿病周邊神經病變引起的神經性疼痛、帶狀皰疹後神經痛、脊髓損傷所引起的神經性疼痛、纖維肌痛及協助控制特定類型的癲癇發作。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 至 3 次，每次 1 至 2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇、進行透析、腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥、減肥藥 Orlistat、維他命 D 衍生物 Calcifediol。
3. 使用此藥物應注意是否會產生憂鬱症、憂鬱症惡化、自殺念頭或行為以及情緒或行為異常改變的現象。
4. 本藥可能會讓人暈眩、嗜睡，在還沒確定對你有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為頭痛、暈眩、噁心、腹瀉、嗜睡、視力模糊、口乾、周邊水腫、關節痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管性水腫(嘴、唇、咽喉腫脹，伴隨呼吸困難)。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。