



藥物成分	劑型	櫃號
Megestrol Acetate	口服液	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-662		

☞ 藥品商品名及含量

美佳特口服懸液劑 40 毫克/毫升 120 毫升/瓶
(Megatus Oral Suspension)

麥格斯口服懸液劑 40 毫克/毫升 120 毫升/瓶
(Megest Oral Suspension)

第三項商品未決標

☞ 藥品作用

改善後天免疫缺乏症候群患者的厭食症、後天免疫缺乏症候群及癌症患者之惡病體質引起的體重明顯減輕。

☞ 服用方式

1. 40 毫克/毫升劑型通常服用 10-20 毫升/天。
2. 使用前應將容器振搖均勻。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
4. 服用劑量隨病情不同有所差異，請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
5. 使用前應先將容器振搖均勻

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是已知或懷疑懷孕。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥 **dofetilide**，兩者併用可能會增加心臟毒性(心律不整、心跳驟停)的風險。
3. 常見副作用為消化不良、腹瀉、脹氣、噁心、陽痿、皮疹、體重上升等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請

4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：視覺出現變異(模糊或複試)、眼白/皮膚變黃、噁心嘔吐不止、不正常的出血/瘀青，下肢嚴重水腫、突發性的側邊頭痛或單側麻木、胸痛、呼吸困難、臉部或喉部腫脹。
5. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能對新生兒有不良影響，治療期間應停止授乳。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，如：糖尿病、血液栓塞疾病、腎上腺系統疾病及其它癌症。
7. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，如:抗凝血劑 warfarin。
8. 常見副作用為可能有血壓升高、流汗、熱潮紅、體重增加、腹瀉、胃腸脹氣、噁心、嘔吐、失眠、情緒波動、陽痿等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
9. 如果有下列症狀，請立刻就醫：突然頭痛或嚴重頭痛、胸痛、呼吸困難、視覺困難、不尋常出血等。
10. 懷孕分級為 X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，建議可能懷孕的婦女要避孕；本藥可能會分泌到母乳裡，服期間不建議使用。