



藥物成分

劑型

櫃號

Hydralazine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-620

☞ 藥品商品名及含量

壓平利淨錠 10 毫克/錠 (Aprezin)

血得平錠 10 毫克/錠 (Stable)

☞ 藥品作用

治療高血壓，可單獨使用，通常與其他抗高血壓劑併用。

☞ 服用方式

1. 通常每天 4 次，每次 1~5 粒。
2. 與食物併服可以增加藥物作用，最好維持穩定的服藥與進食之間的關係性，避免藥物作用強度不一。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 hydralazine 或 dihydralazine 過敏、冠狀動脈疾病、二尖瓣風濕性心臟病、自發性全身性紅斑性狼瘡、充血性心臟衰竭、嚴重心搏過速和相關疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為姿勢性低血壓、噁心、嘔吐、頭痛等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：紅斑狼瘡樣症狀(發燒、肌痛、皮膚疹、關節痛、貧血、皮膚病變)、末梢神經炎(感覺異常、鈍重感、刺痛感)。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。