



藥物成分	劑型	櫃號
Carbamazepine	口服藥	

版本：TPE202309／檔號：2023-547

## ☞ 藥品商品名及含量

癲通長效膜衣錠 200 毫克/錠 (Tegretol CR Tablets)

## ☞ 藥品作用

癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患、原發性舌咽神經痛。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1~4 次，每次 1 粒。
2. 即使您已感覺好轉，仍應繼續服藥；未經醫師指示前不可擅自停藥，突然停藥可能導致抽搐或增加發作頻率。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是是否有心臟、腎臟或肝臟疾病、青光眼、血液異常病史。
2. 請告訴醫師或藥師您正服用的藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑 (MAOIs)、erythromycin、clarithromycin、itraconazole、ketoconazole、fluconazole、viroconazole、ritonavir 等。
3. 本藥與荷爾蒙避孕藥併用可能會導致避孕藥效果降低，用藥期間建議採取其他避孕方式。
4. **本藥可能會導致嗜睡、警覺性降低，在您沒確定此類藥物對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
6. 本藥可能導致您的皮膚對陽光敏感，請避免不必要或長時間曝曬於太陽下，並穿著保護的衣物，配帶太陽眼

鏡，擦防曬乳。

7. 若出現下列症狀，請盡速就醫：喉嚨痛、異常出血或瘀青、發燒、嘴巴痛、分散的斑點或斑丘疹症狀等。
8. 懷孕級數：D，若女性計畫懷孕請告知您的醫師；本藥可能會分泌到母乳裡，若您給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。