



藥物成分	劑型	櫃號
Imidapril	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-626		

☞ 藥品商品名及含量

田納滋錠 5 毫克/錠 (Tanatril)

☞ 藥品作用

治療高血壓，可以讓周邊血管擴張及減少血管阻力。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1~2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾使用降血壓藥物發生過血管性水腫、有高血鉀、腎功能異常或是腦血管障礙等情形。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他降血壓藥物、利尿劑、鉀補充製劑、鋰製劑、非類固醇性的消炎止痛劑。
3. 常見副作用為乾咳、血壓降低、暈眩、頭痛及咽部不適或不快感，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心悸、呼吸困難、以顏面/舌頭/聲門或喉頭腫脹為症狀之血管性水腫，或是觀察到紅斑、水泡、搔癢、發熱及黏膜疹等。
5. 女性計畫懷孕或已懷孕禁止使用本藥。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。