

藥物成分

劑型

櫃號

**Betahistine
dihydrochloride**

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-053

☞ 藥品商品名及含量

寧耳眩錠 24 毫克/錠 (Nilasen Tablets)

眩耳聰錠 24 毫克/錠 (Harkin Tablets)

☞ 藥品作用

治療暈眩、聽力障礙的相關症狀。

☞ 服用方式

1. 每日 2 次，每次 1 粒。
2. 通常與食物併服，能消除輕微腸胃不適副作用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
4. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嗜鉻細胞瘤、氣喘或消化性潰瘍病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為輕微胃炎之不適，但一般都不嚴重，若出現噁心、嘔吐，飯後使用可改善腸胃症狀，如症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚過敏反應(皮疹、癢疹、尋麻疹)、嚴重噁心嘔吐或腹痛、嘔吐物中出現血跡。
5. 目前對胎兒的風險不明，孕婦仍不宜使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。