



藥物成分

劑型

櫃號

Mifepristone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-299

☞ 藥品商品名及含量

保諾錠 200 毫克/錠 (Apano)

☞ 藥品作用

懷孕前期 (小於七週) 子宮內孕之人工流產

☞ 服用方式

1. 一般一次給予3粒，2天後需搭配服用前列腺素類似物，加強子宮收縮以排除子宮內的懷孕組織。
2. 本藥限由醫師處方使用，應由醫師檢查確定為子宮內懷孕，而無子宮外孕的可能。
3. 本藥限由合於優生保健法規定之婦產科醫師，在公私立醫療院所執行使用，病人須於醫護人員面前服用。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是出血性疾病、慢性肝衰竭、慢性腎臟竭、營養不良、前列腺素過敏史、心血管疾病、35 歲以上且每天抽煙超過 10 支的婦女。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是長期服用類固醇、抗凝血劑、非類固醇抗發炎藥。
3. 因非類固醇抗發炎藥有拮抗前列腺素的特性，因此會降低此藥的效用，應避免合併使用。
4. 以此藥墮胎也可能失敗，若是不完全流產，胎兒繼續成長可能會有畸形的危險，因此若服用此藥後必須確實回診追蹤，若本法失敗，需進行其他墮胎方式。
5. 常見副作用為出血、子宮收縮、腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚疹、頭痛、熱潮紅、頭暈、寒冷等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：劇烈腹痛、骨盆痛、發燒等超過 4 小時；腹痛、全身不適超過 24 小時。