



藥物成分	劑型	櫃號
Acetaminophen	口服液	

版本：TPE202309／櫃號：2023-506

## ☞ 藥品商品名及含量

安佳熱糖漿 24 毫克/毫升 (Anti-Phen Syrup)

## ☞ 藥品作用

退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

## ☞ 服用方式

- 發燒或需要時服用，若症狀持續，則每 4-6 小時可重複使用，每 24 小時之內不可超過 5 次。
  - 12 歲以上以及成人: 20-30 毫升
  - 6 歲以上未滿 12 歲: 每次 10 -15 毫升。
  - 3 歲以上未滿 6 歲: 每次 5- 7.5 毫升。
  - 3 歲以下之嬰幼兒: 未經醫師指示不宜自行使用。
- 若使用小量杯測量藥液，請確保測量時眼睛與刻度平視。若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 acetaminophen 過敏，肝臟或腎臟方面的疾病。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是不應與其他含有 acetaminophen 成分的藥品同時使用因為易造成劑量過高甚至中毒。
- 此藥品含阿斯巴甜(aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者不宜使用。
- 常見副作用為噁心、嘔吐、頭暈、搔癢、便秘等症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應（臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐）。

6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應/臨床資料不足/有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量稀少，可安全使用於哺乳婦女。