



藥物成分

劑型

櫃號

Acyclovir

眼用藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-010

## ☞ 藥品商品名及含量

力克眼用軟膏 3% 4.5 公克 (Devirus Ointment)

## ☞ 藥品作用

用於治療單純疱疹性角膜炎。

## ☞ 使用方式

1. 將軟膏擠出 1 公分，塗於下結膜囊中，每天塗用 5 次，每次間隔約 4 小時，痊癒後須再繼續治療 3 天。
2. 軟膏容器尖端應避免接觸眼睛、眼瞼、手指頭等部位。
3. 開封一個月後，未用完之殘藥請丟棄。
4. 使用兩種以上眼藥時，先使用藥水再用藥膏，並間隔至少 5 分鐘。
5. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是免疫系統疾病、肝腎功能障礙、後天免疫缺乏症候群。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗病毒藥、免疫抑制劑。
3. 治療期間建議暫停配戴隱形眼鏡。
4. 建議在點藥後閉合鼻淚管或輕輕閉上眼睛 2 分鐘。這可以減少點眼藥物經由眼部通道所造成的全身性吸收、因而降低全身性不良反應。
5. 常見副作用為刺痛、發癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏現象(搔癢或蕁麻疹、**

**臉部或四肢腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難)、排尿量或排尿頻率突然變少、皮膚或眼睛變黃。**

7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師。