



## 藥物成分

Rivastigmine

## 劑型

貼片

## 櫃號

版本：TPE202309／檔號：2023-734

### ☞ 藥品商品名及含量

憶思能穿皮貼片(5cm<sup>2</sup>) 9 毫克/片 (Exelon Patch 5)



憶思能穿皮貼片(10cm<sup>2</sup>) 18 毫克/片 (Exelon Patch 10)




### ☞ 藥品作用

本藥用於治療輕度至中度阿滋海默氏病之癡呆(失智)症。

### ☞ 使用方式


1. 通常每日 1 次，每次 1 片。每天於固定時間更換新的貼片。
2. 應貼在乾淨、乾燥、無毛且無發紅、刺激疼痛、燒傷或割傷的健康皮膚上。
3. 黏貼部位應輪流替換以減少皮膚刺激性，**相同的部位在 14 天內不可重覆黏貼**，可事先規劃黏貼部位的順序。
4. 如果忘記用藥時，應立即貼上新的貼片，到了隔天的給藥時間，再換貼另一片貼片，不可同時貼二片來補償忘記貼的劑量。

使用步驟	圖示
1. 沿虛線剪開封袋，打開後取出貼片。 <b>貼片不可裁剪或折疊。</b>	
2. 貼片的黏性面(接觸面)覆蓋有保護襯片。將保護襯片的一邊剝開。 <b>手指不要碰觸貼片的黏性面。</b>	

使用步驟	圖示
<p>3. 將貼片的黏性面貼在<b>上或下背部、上臂或胸部</b>。 可選擇的區域如右圖所示</p>	<p>每天在以下各部位中擇一貼上一片貼片</p>  <p>前側 或 或 或 或</p> <p>後側 或 或 或 或</p>
<p>4. 將保護襯片的另一邊剝開。</p>	
<p>5. 用手掌<b>按緊貼片至少 30 秒</b>，確保各邊緊密黏附。 可用原子筆在貼片上寫下日期。</p> <p>6. 貼完貼片請用肥皂洗手。</p>	
<p><b>摘除：</b></p> <p>到了隔日要貼新的貼片前再撕下舊的貼片，撕下的貼片應對折貼好放回原本包裝內再丟棄，注意須避免幼兒/寵物碰觸。即使過了 24 小時，貼片上仍可能有藥量殘留，請避免接觸到眼睛，並在摘除貼片後用肥皂洗手。</p>	

## ⊗ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重呼吸道疾病、心律不整、排尿困難、震顫、肝功能障礙。

- 
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗膽鹼藥、metoclopramide、 $\beta$ -blocker、oxybutinin、tolterodine。
  3. 請勿吸菸，吸菸會降低該藥療效。
  4. 避免將貼片長時間曝露在外部的熱源(過度日曬、三溫暖、日光浴等高溫環境)。
  5. 若貼片脫落無法再貼回時，請立即貼上新的貼片，隔天再於原本預定換藥的時間再換一片新的貼片。
  6. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、食慾減低、疲倦、頭暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
  7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚過敏反應(搔癢、發熱、蕁麻疹)、胃出血、排尿困難、癲癇、震顫、心跳不規則、視力變化。
  8. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，由於授哺乳期間資料不足有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。