



藥物成分	劑型	櫃號
Voriconazole	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-795		

☞ 藥品商品名及含量

遠徽膜衣錠 200 毫克/錠 (VAWAY)

徽飛膜衣錠 200 毫克/錠 (Vfend)

☞ 藥品作用

1. 治療侵入性麴菌症。
2. 治療嚴重之侵犯性念珠菌感染。
3. 治療足分枝菌和鐮刀菌之嚴重黴菌感染。
4. 預防高危險患者發生侵入性黴菌感染，包括接受造血幹細胞移植(HSCT)的患者。

☞ 服用方式

1. 患者體重 ≥ 40 公斤：起始劑量每 12 小時 1 次，每次 2 粒；持續劑量每 12 小時 1 次，每次 1 粒。
2. 患者體重 < 40 公斤：起始劑量每 12 小時 1 次，每次 1 粒；維持劑量每 12 小時 1 次，每次 0.5 粒。
3. Voriconazole 膜衣錠需於飯前至少一小時或飯後一小時服用。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎疾病或心臟相關疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 terfenadine、astemizole、cisapride、pimozide、quinidine、sirolimus、rifabutin、rifampicin、carbamazepine、phenobarbital、ergotamine 或高劑量的 efavirenz、ritonavir。
3. 常見副作用為視覺障礙、發燒、出疹、嘔吐、噁心、腹瀉、



頭痛、周邊水腫以及腹痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

4. Voriconazole 可能對於視覺造成暫時而可逆性的影響，包括視覺模糊、視覺感知的改變/加強和/或畏光。患者在經歷這類症狀時，必須避免有潛在危險的工作，例如開車或操作機械。使用 voriconazole 的患者不應於夜間駕駛。
5. Voriconazole 不得於懷孕時使用，除非對母體的好處明顯超過對胎兒的潛在風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌至乳汁的狀況尚未經調查，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。